

Rp.

Bicarbonat de sodiu 0,50 gr.  
 Silicilat de sodiu . . 0,20 gr.  
 pentru 1 bulin.  
 (Lemoine).

Rp.

Salicilat de sodiu . . 0,50 gr.  
 Bromhidrat de chinină . . . . . 0,25 gr.  
 pentru 1 bulin; 3—4 pe zi.  
 Migrenă.  
 (Gilbert și Michel).

*Colutoriu.*

Rp.

Salicilat de sodiu . . 20 gr.  
 Apă . . . . . 100 gr.  
 In stomatita aftoasă.  
 (E. Hirtz).

*Clismă.*

Rp.

Salicilat de sodiu . . 4 gr.  
 Laudanum Sydenham . . . . . XX picături  
 Apă distilată . . . . 150 gr.  
 Contra reumatismului articular acut.  
 (Gilbert și Michel).

*Gargară.*

Rp.

Salicilat de sodiu . . 8 gr.  
 Antipirină . . . . . 2 gr.  
 Glicerină . . . . . 25 gr.  
 Apă distil. . . . . 275 gr.  
 De 3 ori pe zi pentru a se gargarisi. Faringită reumatismală  
 (Hieguet).

Formular Magistral

*Loțiuni.*

Rp.

Salicilat de sodiu }  
 Bicarbonat de sodiu } aă 5 gr.  
 Apă distilată . . . . 500 gr.  
 Antipruriginos.  
 (Gilbert și Michel).

Rp.

Salicilat de sodiu }  
 Apă de lauro cerasus } aă 25 gr.  
 Alcool 90° }  
 Apă distil. q. s. pentru . . . . . 500 cmc.  
 Cosmetic pentru mâini.  
 (Gilbert și Michel).

*Poțiune*

Rp.

Salicilat de sodiu . . 12 gr.  
 Rom . . . . . 40 gr.  
 Sirop de coji de porcale . . . . . 50 gr.  
 Apă distilată q. s.  
 pentru . . . . . 180 cmc.  
 O lingură = 1 gr. de salicilat de sodiu.  
 (Lyon și Loiseau).

Rp.

Salicilat de sodiu . 4—6 gr.  
 Rom . . . . . 30 gr.  
 Sirop de lămâi . . . 30 g  
 Apă distilată . . . . 80 gr  
 In 4 rânduri în 24 ore  
 Antireumatismal. (Graves).

*Pomadă.*

Rp.

Salicilat de sodiu . . 5 gr.  
 Acid fenic . . . . . 2 gr.  
 Axungia . . . . . 40 gr.  
 Contra peladei.  
 (Gilbert și Michel).

Rp.  
 Salicilat de sodiu . . . 30 gr.  
 Iodoform . . . . . 10 gr.  
 Extr. de hiosciam . . . 5 gr.  
 Vaselină . . . . . 100 gr.  
 Contra reumatismului articular acut. (Fienga).

*Pachete.*

Rp.  
 Salicilat de sodiu . . . 30 gr.  
 Pudră de Dover . . . 3 gr.  
 Esență de mentă VIII picăt.  
 Să se împartă în 20 pachete.  
 3—4 pe zi. Contra corizei.  
 (Gilbert și Michel).

*Sirop.*

Rp.  
 Salicilat de sodiu . . . 10 gr.  
 Sirop de lămâi . . . 50 gr.  
 Sirop de cinci rădăcini . . . . . 150 gr.  
 (G. Lemoine).

*Soluțiuni.*

Rp.  
 Stovaină . . . . . 0,25 gr.  
 Salicilat de sodiu . . . 0,50 gr.  
 Apă distil. și steril. . . 25 gr.  
 Să se injecteze 5 cme. pe traectul nervului dureros. In nevralgii.  
 (Lyon și Loiseau).

Rp.  
 Salicilat de sodiu . . . 20 gr.  
 Bicarbonat de sodiu . . . 10 gr.  
 Apă disitil. q. s.  
 pentru . . . . . 300 cme.  
 1 lingură = 1 gr. salicilat de sodiu.  
 (Gilbert și Michel)

Rp.  
 Salcilat de sodiu . . . 5 gr.  
 Iodur de potasiu . . . 1—2 gr.  
 Apă distil. . . . . 180 gr.  
 Să se ia cu lingura în timpul zilei. In polinevrită în cursul reumatismului acut.  
 (O. Martin)

**PERSONALUL MEDICAL DELA  
 SPITALUL DIN SIBIU**

- 1) Dr. Bolintineanu, medic director tehnic, medic primar la secția I-a chirurgicală.
- 2) Dr. Lucian Cornea, medic director administrativ.
- 3) D-na Dr. Elvira Bolintineanu, medic prosector.
- 4) Dr. Octavian Filipescu, medic primar la secția II-a chirurgicală.
- 5) Dr. Hirsch Ernst, medic primar la secția dermatovenerică.
- 6) Dr. Iosif Stoichiță, medic primar la secția tuberculoși.
- 7) Dr. Carol Ungar, medic primar la secția contagioși.
- 8) Dr. Max Schuller, medic primar la secția medicală.
- 9) Dr. Valer Mutter, medic primar la secția oftalmologică, detașat dela spitalul Filantropic din Craiova
- 10) Dr. Ernst Wachsmann, medic secundar la secția chirurgicală.
- 11) Dr. Carol Albrick, medic secundar la secția chirurgicală.
- 12) Dr. Victor Weindel, medic secundar la secția medicală.
- 13) Dr. Emil Zürner, medic secundar la secția medicală.
- 14) Dr. Arnold Arz, medic secundar la secția oftalmologică, detașat la radiologie.
- 15) Dr. Anton Busulenga, medic secundar.
- 16) Maria D. Costin, farmacistă.

**687 Salol.** Salicilat de fenol  $C^6H^4 \begin{matrix} \text{OH} \\ \text{CO}^2 \end{matrix} C^6H^5$

100 părți salol=43 părți fenol și 63 părți acid salicilic.

**Prop. fiz. și chim.** Pudră cristalină albă, cu miros puțin aromatic, insolubilă în apă, solubilă în 10 părți alcool, foarte solubilă în eter, cloroform, vaselină, oleuri fixe, balsamul copaiv, esența de santal.

Cu camforul dă un produs lichid, salolul camforat. In intestin, sucul pancreatic, îl dedublează în fenol și acid salicilic.

**Incomp.** Cloralul.

**Toxic.** Putere toxică are slabă, însă provoacă eritem gingivită, în urma întrebuințării locale a salolului.

**Prop. și indic. terap.** Intern se utilizează ca antiseptic